Attention : N'oubliez pas d'aviser un membre de notre équipe médicale lors de votre prochaine visite si vous avez eu un ou plusieurs de ces signes ou symptômes. Ces informations nous permettront d'assurer une surveillance étroite lors de votre prochaine transfusion.

Pour trouver un établissement de santé près de votre domicile via le web :

➔ *https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/*

Pour consultation en ligne du document **« Transfusion sanguine : Des réponses à vos questions » :**

➔ *https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000462/*



notes :

Répertoire des ressources

- CISSS des Îles
  Unité d'un jour :
  418 986-2121, poste 8158
  Unité d'hémato-oncologie :
  418-986-2121 poste 8217

- Info-santé (24 h/24 h, 7 jours/semaine)
  Téléphone : 811

Conception graphique : service d'illustration médicale
de la Direction de l'enseignement et des affaires universitaires
du CHU de Québec-Université Laval

Ce document est protégé sous la licence Creative Commons :
distribution non commerciale et reproduction en tout ou en partie permises,
en mentionnant la source : CHU de Québec-Université Laval.
Aucune modification autorisée.

CHU de Québec Université Laval

Les réactions transfusionnelles à la maison



Informations aux patients

Équipe de sécurité transfusionnelle


CHU de Québec-Université Laval © 2016

Vous venez de recevoir une transfusion sanguine et il est normal que vous ayez des questions à ce sujet.

Lors de votre départ, le personnel soignant vous a remis un dépliant intitulé : « **Transfusion sanguine : Des réponses à vos questions** ».

Nous vous invitons à le consulter attentivement et à le conserver car il contient de l'information importante sur la transfusion sanguine.


Cependant, même si la transfusion sanguine est d'une aide précieuse pour guérir ou contrôler un grand nombre de maladies, elle n'est pas sans risque. Il arrive parfois que des réactions transfusionnelles apparaissent tardivement, même une fois de retour à la maison.



Qu'est-ce qu'une réaction transfusionnelle ?

Une réaction transfusionnelle est un événement qui cause des effets indésirables pendant ou après une transfusion sanguine. Les signes et symptômes que l'on observe au cours d'une réaction transfusionnelle sont variables :

- **Fièvre**
- **Frissons non contrôlés**
- **Rougeur ou plaques (urticaire)**
- **Démangeaisons**
- **Nausée, vomissement**
- **Maux de tête**
- **↑ ou ↓ de la tension artérielle**
- **↑ de la fréquence cardiaque**
- **Douleurs musculaires**
- **Douleurs dorsales**
- **Gêne ou difficulté respiratoire**



Que dois-je faire si j'ai un ou des signes ou symptômes ?

Dans la majorité des cas, il s'agit de réactions mineures sans conséquences graves. Elles peuvent être traitées aisément par la prise de médicaments en vente libre. Informez-vous auprès de votre pharmacien. Il pourrait vous suggérer, par exemple, la prise d'acétaminophène ou d'antihistaminique, dépendamment de vos signes et symptômes.

Que dois-je faire si j'ai un doute ou si je suis inquiet ?

Contactez Info-santé ou un membre de notre équipe médicale. Vous retrouverez les numéros de téléphone à l'endos de ce dépliant.

Présentez-vous à l'urgence d'un établissement de soins de santé le plus près de votre domicile si un ou des signes ou symptômes se détériorent ou persistent plus de 48 heures.

